DK BRUGSANVISNING FOR PATIENTEN

Podepend til selvindsamling af vaginalprøve
Abn podependin lige før brug og undgå at røre ved overflader med podependens spids.
Må ikke bruges under graviditet og tre måneder efter fødsel.

Vask hænderne. Indtag en komfortabel stilling af tag prøven.
Returnér podependin ved at følge de separat leverede anvisninger.

BEMÆRK: Hvis uventede hændelser, der ikke er beskrevet i disse anvisninger, optræder under selvindsamling, kontakt din læge.

FA دستورالعمل های استفاده برای

سوآب برای نمونه گیری شخصی از واژن
سوآب را با فاصله قبل از استفاده از کنید و مراقب باشید نوک آن به هیچ سطحی تماس نداشته باشد.
در زمان بارداری یا در مدت سه ماه بعد از زایمان از این روش استفاده کنید.
دست جابجایی را بشوید. در حالت راحتی نشینید و نمونه گیری را انجام دهید.

سوآب را با توجه به دستورالعمل های که به صورت جداگانه ارائه شده است برگردانید.
تذکره: اگر هنگام نمونه گیری از خودتان وضعیت غیرمنتظره ای روی داد که در این دستورالعمل ها توضیح داده نشده است، با پزشکتان تماس بگیرید.

HB UPUTE ZA UPOTREBU ZA PACJENTA

Bris za samostalno uzimanje vaginalnog uzorka
Otvorite bris netom prije upotrebe i pazite da ne dodirujete druge površine viskom brisa.
Ne upotrebljavajte tijekom trudnoće ili tijekom tri mjeseca nakon poroda.

Operite ruke. Namjestite se u udoban položaj i uzimajte uzorak.
Vratite bris pridržavajući se zasebno isporučeni upute.

NAPOMENA: Ako se tijekom samostalnog uzimanja brisa dogode neočekivani događaji koji se ne opisuju u ovim uputama, obratite se svom liječniku.

IS NOTKUNARLEIÐBYNIR FYRIR SJÚKLINGINN

Strok til að taka sjálf sjóni úr leggöngum
Taktu upp strokið rétt fyrir notkun og gettu þess að snerta enga flöt með framendunni á strokinu.
Eldki nota á meðgöngu eða næstu þrjú mánuði eftir fæðingu.

Þvoðu þér um hendurnar. Komdu þér vel fyrir og taktu sjóni.
Skilðu strokinu samkvæmt sérstökum leiðbeiningum sem fylgja.

ATHS: Ef upp koma óvænnt atvik, sem ekki er lýst í þessum leiðbeiningum, á meðan þú tekur sjálf sjóni, skaltu hafa samband við lækninn.

LS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA PACIENTAMS

Sepetēlis paimti tepinēliu is makšties
Išmēkite šepetēli is jēdēlo priēš pat naudojimi ir bŭkiete atsargis, kad šepetēlio galiku nepaļiestu-mēte jokuju pavirši.

Nenaudokite, jei esate nēšģia ar nepraējus trims mēnesiams po gimdyimo.
Nesuplakiet rŭkas. Īsitaizykite patoģioje padēyite ir paimtikie tepinēli.

Grāzinkite šepetēli vadovadumies atskirai pateiktomis instrukcijoms.
PAŠTABA: Jei tepinēlio paēmimo metu atsitikty šios instrukcioje neaprašytas įvykis, kreipkitės į gydytoją.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Στελεός για την αυτοσωλληγη κολληκού δειγματού.
Ανοίξετ η συσκευασία του στελεού ακριβώς πριν από η χρήση και προείξετε το άκρο του στελεού να μην αγγίξει σε επιφάνειες.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την εγκυμοσύνη ή κατά το τρίμηνο μετά το τοκετό.

Πλύνετε τα χέρια σας. Πάρτε μια άνετη θέση και συλλέξετε το δείγμα.
Γυρίστε το στελεό σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται χωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά την αυτοσωλληγη προκύψουν απροόδοκτα συμβάντα που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

FI KÄYTTÖOHJEET POTILAALLE

Puikko emättänyttöen omatoimiseen ottamiseen
Avaa puikko vasta juuri ennen käyttöä ja varmista, ettei kosketa puikon kärjellä mitään pintoja.
Puikkoa ei saa käyttää raskauden aikana eikä kolmen kuukauden sisällä synnyttämisestä.

Pese kädet. Käy mukavaan asentoon ja ota näyte.
Palauta puikko erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA: jos näytteen omatoimisen ottamisen aikana tapahtuu jotain odottamatonta, mitä ei ole mainittu näissä ohjeissa, ota yhteys lääkäriin.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS A PÁCIENS SZÁMÁRA

Tampón a hüvelyi minta önálló levételéhez
Nyissa ki a tampont közvetlenül a használat előtt, és ügyeljen arra, hogy ne érnjen semmilyen felülethez a tampont hegyével.
Ne használja terhesség alatt vagy a szülés utáni három hónapig belül.

Mosson kezet. Kényelmesen helyezkedjen el, és vegye le a mintát.
Juttassa vissza a tampont a külön mellékelt utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a jelen utasítások-ban nem ismertetett váratlan események fordulnak elő az önálló mintavétel során, forduljon kezelőorvosához.

JA 患者のための使用説明書

膣組織サンプルの自己採取用綿棒
使用する直前に綿棒を開封し、その先端がどこにも触れないようにしてください。
妊娠中及び出産後3ヶ月以内には使用しないでください。

手を洗います。落ち着いた姿勢になり、サンプルを採取します。
別の指示に従って綿棒を返却します。

注: サンプルの採取に際し、説明書に記載のない予想外の事態が発生した場合には、医師に連絡してください。

LV LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI PACIENTAM

Tampons makssts parauga pašņemšanai
Atveriet tamponu tieši pirms lietošanas un uzmanieties, lai ar tampona galu nepieskaros nevienai virsmai.

Nesietiet tamponu tieši pirms lietošanas un uzmanieties, lai ar tampona galu nepieskaros nevienai virsmai.
Nesuplakiet rŭkas. Īsitaizykite patoģioje padēyite ir paimtikie tepinēli.

Grāzinkite šepetēli vadovadumies atskirai pateiktomis instrukcijoms.
PAŠTABA: Jei tepinēlio paēmimo metu atsitikty šios instrukcioje neaprašytas įvykis, kreipkitės į gydytoją.

PIEZĪME: Ja parauga ņemšanas laikā rodas negaidīti notikumi, kas nav aprakstīti šajā instrukcijā, sazinieties ar savu ārstu.

ET KASUTUSJUHEND PATSIENDILE

Tampoon tupeproovi ise kogumiseks
Avage tampoon vahetult enne kasutamist ja olge ettevaadlik, et te ei puudutaks tamponi otsaga ühtki pinda.
Ärge kasutage raseduse ajal ega kolme kuu jooksul pärast sünnitust.

Peske käed puhtaks. Olge mugavas asendis ja võtke proov.
Tagastage tampoon, järgides eraldi antud juhiseid.

NB! Kui proovi võtmisel ilmnevad ootamatud sündmused, mida selles juhendis ei ole kirjeldatud, võtke ühendust oma arstiga.

GA TREORACHA ÚSÁIDE LE HAGHAIDH AN OTHAIR

Maipin chun sampla faighne a bhailiú sa bháile
Oscail an maipin díreach sula n-úsáidtear é agus ná lig do bharr an mhaipin teagmháil le haon dromchla.
Ná húisid má tá tú ag iomparr dáinne ná ar feadh trí mhí tar éis leanbh a bhéith agat.

Nigh do lámha. Cinnigh go bhfuil tú comphodach, ansin bailigh an sampla.
Lean na treoracha atá curtha ar fáil ar leithligh chun an maipin a sheoldadh ar ais.
TABHAIR FAOI DEARA: Má tharlaíonn rud éigin nach bhfuil cur síos déanta air sna treoracha seo agus sampla á bhailiú agat, déan teagmháil le do dhochtúir.

ID PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK PASIEN

Pengoles untuk mengambil sendiri sampel dari vagina
Buka pengoles tepat sebelum digunakan dan berhati-hatilah untuk tidak menyentuh permukaan apa pun dengan ujung pengoles. Jangan gunakan selama masa kehamilan atau dalam jangka waktu tiga bulan setelah melahirkan.

Cuci tangan Anda. Tempatkan diri Anda dalam posisi yang nyaman dan ambil sampel.
Kembalikan pengoles sesuai dengan petunjuk yang diberikan secara terpisah.

CATATAN: Apabila terjadi peristiwa tak terduga yang tidak diuraikan dalam petunjuk ini selama pengambilan sampel sendiri, hubungi dokter Anda.

KO 환자를 사용 지침

질 검체 자가 채취용 면봉
사용 직전에 면봉을 열고, 면봉 팁이 어떤 표면에도 닿지 않도록 주의하십시오. 임신 중일 경우 또는 출산 후 3개월 동안에는 사용하지 마십시오.

손을 씻으십시오. 편안한 자세로 검체를 채취하십시오.
별도로 제공된 지침에 따라 면봉을 반환하십시오.

참고: 자가 채취 중에 이 지침에 나와 있지 않은 예기치 않은 상황이 발생할 경우 의사에게 문의하십시오.

MS ARAHAN PENGGUNAAN UNTUK PESAKIT

Putik kapas kesat untuk pengambilan sendiri sampel faraj
Buka putik kapas kesat betul-betul sebelum penggunaan dan berhati-hati supayaujung putik kapas kesat tidak tersentuh pada sebarang permukaan. Jangan guna semasa hamil atau dalam tempoh tiga bulan selepas melahirkan anak.

Basuh tangan anda. Pastikan badan anda dalam kedudukan yang selesa dan ambil sampel.
Kembalikan putik kapas kesat dengan mengikut arahan yang disediakan secara berasingan.

PERHATIAN: Sekiranya peristiwa tidak dijangka yang tidak diterangkan dalam arahan ini berlaku semasa pengambilan sendiri, hubungi doktor anda.

MO STRUZZJONIJET GHALL-UŻU MILL-PAZJENT

Swab għat-tehid tieghek stess ta' kampjun vaginali
Itrah l-Iswab etatt qabel l-użu u oqgħod attenta li ma tmissx uchi bil-ponta tas-swab.
Tmax waqt it-tqala jew fit-tlekk khur wara li twelld.

Ahsel idej. Pogġi ruhek f'pożizzjoni konfortabbli u h-kampjun.
Irritorna l-Iswab billi ssewvi l-Istruzzjonijiet iprovduti separatament.

NOTA: Jekk isehbu avvenimentu mhux mistennja li mhumiex deskritti f'dawn l-Istruzzjonijiet waqt li tiehu l-kampjun, ikkuntattja t-tabib tieghek.

PL INSTRUKCJA UŻYCIA DLA PACJENTKI

Wymazówka do samodzielnego pobrania próbki z pochwy
Otwórz wymazówkę bezpośrednio przed użyciem z wyjątkiem ostrożności, aby nie dotykać końcówki wymazówki żadnych powierzchni.

Nie stosować w czasie ciąży lub w okresie trzech miesięcy po porodzie.
Umyj ręce. Przyjmij wygodną pozycję i pobierz próbkę.

Przeak wymazówkę zgodnie z instrukcjami dostarczonymi oddzielnie.
UWAGA: W razie wystąpienia podczas samodzielnego pobierania próbki nieoczekiwanych zdarzeń, których nie opisano w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z lekarzem.

RU РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Тампон для самостоятельного забора вагинальных клинических образцов
Открывайте тампон следует непосредственно перед его использованием, избегайте контакта наконечника тампона с любой поверхностью. Не используйте тампон во время беременности или в первые три месяца после родов.

Вымойте руки. Примите удобное для вас положение и произведите забор образца.
Передайте образец медицинскому персоналу, следуя отдельным полученным инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если во время самостоятельного забора образцов возникнут непредвиденные обстоятельства, не описанные в настоящем руководстве, обратитесь к вашему лечащему врачу.

SL NAVODILA ZA UPORABO ZA BOLNIKA

Tester za samodvzmem vaginalnega vzorca
Tester odprite tik pred uporabo in pazite, da se s konico testerja ne dotaknete nobene površine.
Ne uporabljajte med nosečnostjo ali tri mesece po porodu.

Umyjte si roke. Namestite se v udoben položaj in odvzemite vzorec.
Tester wrnite v skldu z ločenimi navodili.

OPOMBA: Če med samodvzmemom pride do nepričakovanih dogodkov, ki niso opisani v teh navodilih, se obrnite na svojega zdravnika.

TH คำแนะนำในการใช้งานสำหรับคนไข้

ไม้พินสำลี (Swab) สำหรับเก็บตัวอย่างส่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตนเอง
เปิดซองไม้พินสำลีเมื่อพร้อมที่จะใช้งาน และระวังไม่ให้สำลีที่ปลายไม้สัมผัสกับสิ่งใด ห้ามใช้สำลีมาตรวจคลอดระหว่างตั้งครรภ์หรือภายในสามเดือนหลังคลอด

ล้างมือให้สะอาด จัดท่าทางของร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วเก็บตัวอย่างจากช่องคลอด
นำตัวอย่างส่งส่งตรวจมาคืนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้

หมายเหตุ: หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำแนะนำนี้เกิดขึ้นระหว่างการเก็บตัวอย่างส่งส่งตรวจด้วยตนเอง โปรดติดต่อแพทย์เจ้าของไข้

NO BRUKSANVISNING FOR PASIENTEN

Vattpinne for selvinnsamling av en vaginal prøve
Åpne vattpinnen rett før bruk og pass på at du ikke berører noen overflater med vattpinnen.
Skal ikke brukes under graviditet eller i de tre månedene etter fødselen.

Vask hendene dine. Sett deg selv i en komfortabel stilling og samle inn prøven.
Returner vattpinnen ved å følge instruksjonene som følger med separat.

OBS: Skulle uventede hendelser som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen oppstå under selvinnsamling, kontakt legen din.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU PACIENT

Bețișor pentru autorecoltare de probă vaginală
Deschideți bețișorul chiar înainte de utilizare și aveți grijă să nu atingeți vreo suprafață cu vârful bețișorului.

Ne utilizați în timpul sarcinii și timp de trei luni după naștere.
Spălați-vă pe mâini. Așezați-vă într-o poziție confortabilă și colectați proba.

Returnați bețișorul urmând instrucțiunile furnizate separat.
SURVĂȚIE: Dacă în timpul autorecoltării survin evenimente neașteptate care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni, contactați medicul.

SK NÁVOD NA POUŽITIE PRE PACIENTA

Tampón na vlastný odber vaginálnej vzorky
Tampón otvorte tesne pred použitím a dávajte pozor, aby ste sa špičkou tampónu nedotkli žiadneho povrchu.
Nepoužívajte počas tehotenstva ani počas troch mesiacov po pôrode.

Umyte si ruky. Zaujmite vhodnú pohodlnú polohu a odoberte vzorku.
Tampón vráťte podľa pokynov poskytnutých samostatne.

POZNAMKA: Pokiaľ by sa počas odberu vzorky vyskytli nejaké neočakávané udalosti, ktoré nie sú opísané v návode, kontaktujte svojho lekára.

SV BRUKSANVISNING FÖR PATIENT

Provpinne för vaginal egenprovtagning
Öppna propvinnen strax före användning och var försiktig så att du inte rör in några ytor med spetsen på propvinnen.
Använd inte under graviditet eller under de tre första månaderna efter en förlossning.

Tvätta händerna. Sätt dig i en bekväm ställning och samla in provet.
Återlämna propvinnen i enlighet med de anvisningar som tillhandahålls separat.

OBS: Om oväntade händelser som inte beskrivs i dessa anvisningar inträffar under egenprovtagningen, kontakta din läkare.

UK ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Зонд-тампон для самостійного збору вагінального зразка
Розпакуйте зонд-тампон перед використанням, будьте обережні, щоб не торкнулися наконечником зонд-тампона будь-яких поверхонь. Не використовуйте під час вагітності або протягом трьох місяців після пологів.

Вийміть руки. Встаньте у зручне положення і виконайте збір зразка. Поверніть зонд-тампон, дотримуючись інструкції, які надані окремо.

ПРИМІТКА. Якщо під час самостійного збору зразка виникнуть неочікувані явища, не описані у цих інструкціях, зверніться до свого лікаря.

S = SECONDS, SECONDI, SEGUNDOS, SEKUNDEN, SECONDES, SEGUNDOS, SECONDEN, ۴۰ثانیه, SEKUNDY, SEKUNDE, SEKUNDER, ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, SEKUNDIT, ۴۰ثانیه, SEKUNTA, SOČIND, SEKUNDE, MASODPERC, DETIK, SEKUNDUR, ۴۰ثانیه, SEKUNDES, SEKUNDES, SAAT, SEKONDI, SEKUNDEK, SEKUNDY, SECUNDE, СЕКУНД, SEKUNDY, SEKUNDE, SEKUNDER, ۴۰ثانیه, СЕКУНД, سيڪنڊز, ۴۰ثانیه